



Apixaban

1. Indication:

Treats and prevents blood clots.

2. Instruction to use (How is this drug best taken)

- Your doctor will tell you how much medicine to use. Do not use more than directed.
- If you are not able to swallow the tablets whole, they may be crushed and mixed in water
- Missed dose: Take a dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, wait until then and take a regular dose. Do not take extra medicine to make up for a missed dose.
- Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light.

3. Drug-Drug Interaction:

Tell your doctor if you are using any of the following:

- Carbamazepine, itraconazole, ketoconazole, phenytoin, rifampin, ritonavir, St John's wort
- Blood thinner (including clopidogrel, heparin, prasugrel, warfarin)
- Medicine to treat depression
- NSAID pain or arthritis medicine (including aspirin, celecoxib, diclofenac, ibuprofen, naproxen)

4. Side effects:

May include nausea, contusion, anemia, syncope, and hemorrhage.

5. Precaution

- Do not stop using this medicine suddenly without asking your doctor. You might have a higher risk of stroke for a short time after you stop using this medicine.
- Tell any doctor or dentist who treats you that you are using this medicine.
This medicine increases your risk for bleeding that can become serious if not controlled.
- Immediately report signs of blood loss or unusual bleeding.
- Immediately report signs of spinal or epidural hematomas (ie, numbness or weakness of legs or bowel or bladder dysfunction).



أبيكسابان

1. دواعي الاستخدام
يعالج ويمنع تجلط الدم.

2. طريقة الاستخدام:

- سيخبرك طبيبك بالجرعة المناسبة. لا تتجاوز الجرعة الموصوفة.
- إذا لم تتمكن من بلع الأقراص كاملة، يُمكنك سحقها وخلطها بالماء.
- الجرعة الفائتة: تناول الجرعة فور تذكرها. إذا اقترَب موعد الجرعة التالية، فانتظر حتى ذلك الوقت وتناول الجرعة المعتادة. لا تتناول جرعة إضافية لتعويض الجرعة الفائتة.
- احفظ الدواء في عبوة مغلقة في درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن الحرارة والرطوبة والضوء المباشر.

3. التفاعلات الدوائية:

أخبر طبيبك إذا كنت تستخدم أيًا مما يلي:

- كاربامازيبين، إيتراكونازول، كيتوكونازول، فينيتوين، ريفامبين، ريتونايفير، نبتة سانت جون
- مُميّعات الدم (بما في ذلك كلوبيدوغريل، هيبارين، براسوغريل، وارفارين)
- أدوية علاج الاكتئاب
- مُسكّنات الألم أو مُسكّنات التهاب المفاصل (بما في ذلك الأسبرين، سيليكوكسيب، ديكلوفيناك، إيبوبروفين، نابروكسين)

4. الآثار الجانبية:

قد تشمل الغثيان، الكدمات، فقر الدم، الإغماء، والنزيف.

5. الاحتياطات:

- لا تتوقف عن استخدام هذا الدواء فجأةً دون استشارة طبيبك. قد يكون لديك خطر أكبر للإصابة بسكتة دماغية لفترة قصيرة بعد التوقف عن استخدام هذا الدواء.
- أخبر أي طبيب أو طبيب أسنان يُعالجك بأنك تستخدم هذا الدواء.
- يزيد هذا الدواء من خطر النزيف الذي قد يصبح خطيرًا إذا لم تتم السيطرة عليه.
- أبلغ فوراً عن أي علامات فقدان دم أو نزيف غير طبيعي.
- أبلغ فوراً عن أي علامات أورام دموية في العمود الفقري أو فوق الجافية (مثل خدر أو ضعف في الساقين أو خلل في الأمعاء أو المثانة).